

LA MORTALITÉ PAR PNEUMOPATHIE, BRONCHO-PNEUMOPATHIE

Moyennes annuelles 2003-2005

Classification Internationale des Maladies (CIM 10) : causes J12 - J18

Territoire	Nom	Nombre de décès			Indice Comparatif de mortalité			Taux bruts ⁽¹⁾ de mortalité			Taux comparatifs ⁽¹⁾ de mortalité		
		Hom.	Fem.	Ens.	Hom.	Fem.	Ens.	Hom.	Fem.	Ens.	Hom.	Fem.	Ens.
PAYS	France métropolitaine	4 973	5 868	10 840	100,0	100,0	100,0	16,93	18,88	17,93	16,93	18,88	18,01
REGION	Limousin	69	92	161	74,8*	84,5	80,9*	19,65	24,74	22,28	12,65*	16,02	14,58*
DEPARTEMENT	Corrèze	26	27	53	84,1	73,7	78,4	22,57	22,49	22,52	14,32	14,01	14,22
	Creuse	17	24	41	87,4	104,2	97,2	27,52	38,10	32,91	14,42	20,24	17,61
	Haute-Vienne	26	41	67	62,2*	83,3	73,8*	14,97	21,73	18,49	10,49*	15,71	13,22*

Sources : Inserm CépiDC, Insee Estimation population 2004

* Significatif

(1) pour 100 000 hab au 01.01.2004

Exploitation ORS du Limousin

Lecture : Significativement **supérieur** à la moyenne nationale (rouge)

Significativement **inférieur** à la moyenne nationale (vert)